

Exercice

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points

$$A(0; 4; 16), \quad B(0; 4; -10), \quad C(4; -8; 0) \quad \text{et} \quad K(0; 4; 3).$$

On définit la sphère S de centre K et de rayon 13 comme l'ensemble des points M tels que $KM = 13$.

1.
 - a. Vérifier que le point C appartient à la sphère S
 - b. Montrer que le triangle ABC est rectangle en C .
2.
 - a. Montrer que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .
 - b. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
3. On admet que la sphère S coupe l'axe des abscisses en deux points, l'un ayant une abscisse positive et l'autre une abscisse négative.
On note D celui qui a une abscisse positive.
 - a. Montrer que le point D a pour coordonnées $(12; 0; 0)$.
 - b. Donner une représentation paramétrique de la droite Δ passant par D et perpendiculaire au plan (ABC) .
 - c. Déterminer la distance du point D au plan (ABC) .
4. Calculer une valeur approchée, à l'unité de volume près, du volume du tétraèdre $ABCD$.
On rappelle la formule du volume V d'un tétraèdre

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h.$$

où \mathcal{B} est l'aire d'une base et h la hauteur associée.